

1. *L. ursina*. Bd. IX. S. 93. F. 749.  
Myg. *Blondii* Bd. I. S. 25. F. 22.
2. *L. Klugii* Bd. IX. S. 25. F. 708.
3. *L. Erichsoni* Bd. IX. S. 28. F. 709.
4. *L. Reichii* Bd. IX. S. 31. F. 710.
5. *L. rosea*. Bd. IX. S. 59. F. 728.
6. *L. versicolor*. Bd. IX. S. 57. F. 727.

## II. Eurypelma.

Etwas mehr länglicher Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, ziemlich gleich dicke Beine; Körper und Hinterleib dicht langpelzig behaart. Die Sammetbürste der Fusssohlen sehr breit.

1. *E. avicularia*. Bd. IX. S. 73. F. 737.  
Mygale *avicul.* Bd. I. S. 101. F. 75.
2. *E. brunnea*.  
Mygal. *cancerides*. Bd. I. S. 77. F. 57.  
vid. Bemerkung Band 9. S. 63.
3. *E. testacea*. Bd. IX. S. 45. F. 719.
4. *E. diversipes*. Bd. IX. S. 65. F. 731.
5. *E. plumipes*. Bd. IX. S. 67. F. 733.
6. *E. hirsutissima*. Bd. IX. S. 76. F. 738.
7. *E. coracina*. Bd. IX. S. 37. F. 714.
8. *E. anthracina*. Bd. IX. S. 77. F. 739.
9. *E. fimbriata*. Bd. IX. S. 50. F. 722.
10. *E. funebris*. Bd. IX. S. 81. F. 742—43.
11. *E. detrita*. Bd. IX. S. 86. F. 746.
12. *E. convexa*. Bd. IX. S. 91. F. 750.
13. *E. monstrosa*. Bd. V. S. 14. F. 346.
14. *E. athletica*. Bd. V. S. 18. F. 348.
15. *E. conformis* Bd. V. S. 20. F. 349.

16. *E. Herculea*. Bd. V. S. 21. F. 350.
17. *E. fusca*. Bd. IX. S. 32. F. 711.
18. *E. Walkenarii* Bd. IX. S. 46. F. 720.
19. *E. ochracea*. Bd. IX. S. 48. F. 721.
20. *E. laeta*. Bd. IX. S. 66. F. 732.
21. *E. olivacea*. Bd. IX. S. 34. F. 712.
22. *E. brunnipes*. Bd. IX. S. 35. F. 713.
23. *E. fervida*. Bd. IX. S. 78. F. 740.
24. *E. Caffreriana*. Bd. IX. S. 80. F. 741.
25. *E. hirtipes*. Bd. III. S. 38. F. 193.
26. *E. adusta*. Bd. III. S. 37. F. 192.
27. *E. rufidens*. Bd. IX. S. 51. F. 723.
28. *E. annulipes* Bd. IX. S. 52. F. 724.
29. *E. scoparia*. Bd. IX. S. 54. F. 725.
30. *E. leporina* Bd. IX. S. 55. F. 726.
31. *E. Cancerides*. Bd. IX. S. 63. F. 730.
32. *E. plantaris* Bd. IX. S. 71. F. 736.
33. *E. felina*. Bd. IX. S. 96. F. 751a.

### III. *Scurria*

Etwas mehr länglicher Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, ziemlich gleich dicke Beine, Körper und Hinterleib weniger langpelzig behaart. Die Sammetbürste viel schmaler.

1. *S. fasciata*. Bd. IX. S. 41. F. 717.

*Mygale fasciata*. Bd. II. S. 65. F. 157.

2. *S. geniculata*. Bd. IX. S. 43. F. 718.

### IV. *Trechona*.

Länglicher Vorderleib, nicht grosser Hinterleib, lange Beine, die Glieder stufenweis merklich dünner, die Sammetbürste der Fusssohle schmal.

1. *T. Zebra*. Bd. IX. S. 60. F. 729.
2. *T. bistrata*. Bd. V. S. 16. F. 347.
3. *T. incana*. Bd. IX. S. 70. F. 735.
4. *T. icterica*. Bd. V. S. 22. F. 351.
5. *T. lycosiformis* Bd. IX. S. 85. F. 745.
6. *T. drassiformis* Bd. IX. S. 69. F. 734.

## V. *Typhochlaena*.

Länglicher Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, licht behaart, hochfarbig. Beine mässig lang, dicht schuppenhaarig und zottig behaart, mit breiter Sammetbürste der Fusssohle.

1. *T. seladonia* Bd. IX. S. 39. F. 716.
2. *T. caesia*. Bd. IX. S. 83. F. 744.

## VI. *Diplura*.

Sehr lange, gerad ausstehende Spinnwarzen.

1. *D. macrura*. Bd. IX. S. 38. F. 715.

### III. Gattung. *Atypus*. Latr.

1. *A. Sulzeri*. Bd. I. S. 117. F. 88.  
XVI. S. 72. F. 1547-8.

### IV. Gattung. *Actinopus*. Perty.

1. *A. venatorius*  
*Cteniza venatoria* Bd. V. S. 12. F. 345.
2. *A. cafrus*. Bd. IX. S. 98. F. 751 b.
3. *A. tarsalis*. Bd. IX. S. 101. F. 753.
4. *A. longipalpis* Bd. IX. S. 102. F. 754.
5. *A. loricatus*. Bd. IX. S. 99. F. 752.

### V. Gattung. *Teratodes*.

Augen und Fresszangen mit den Gharakteren der Familie übereinstimmend. Letztere mehr walzenförmig. Der Vorderleib mit einem Rückengrübchen. Die männlichen Taster lang, das zweite und vierte Glied fast gleichlang, das dritte und Endglied kurz, die Genitalien frei, kugelförmig, mit gewundenen Hacken. Beine sehr lang. Das erste am längsten, dann folgt das Endpaar, hierauf das zweite und dritte. Der Hinterleib nicht gross, mit Schuppenhärchen bedeckt, und mit kurzen Spinnwarzen.

1. *T. attalicus*. Bd. V. S. 6. F. 343.

2. *T. depressus*. Bd. IX. S. 103. F. 755.

### Familie XIV.

### Zellenspinnen. *Dysderides*.

#### I. Gattung. *Dysdera*. Walk.

1. *D. erythrina*. Bd. V. S. 76. F. 389.

2. *D. rubicunda*. Bd. V. S. 79. F. 390. 91.

*D. erythrina*. Bd. I. S. 7. F. 3.

3. *D. crocata*. Bd. V. S. 81. F. 392—94.

4. *D. punctata*. Bd. V. S. 84. F. 395—96.

5. *D. lepida*. Bd. V. S. 85. F. 397.

6. *D. Hombergii* Bd. X. S. 95. F. 819—20.

#### II. Gattung. *Segestria*. Walk.

1. *Se. florentina*. Bd. I. S. 1. F. 1.

Bd. V. S. 72. F. 385—87.

2. *Se. bavarica* Bd. X. S. 93. F. 818.

3. *Se. senoculata*. Bd. I. S. 6. F. 2.  
Bd. V. S. 75. F. 388.

III. Gattung: *Ariadna*. Sav.

1. *A. pallida*. Bd. X. S. 90. F. 817.

IV. Gattung. *Scytodes*. Walk.

1. *S. tigrina* Bd. V. S. 87. F. 398.  
2. *S. erythrocephala*. Bd. V. S. 90. F. 399

—400.

---

/